


# COVID-19

Цифри і факти


**56 669** щеплень проведено за минулий тиждень  
(на 22,9 % менше ніж попереднього тижня)

**15 382 284** особи в Україні отримали дві дози вакцини від початку кампанії

## ■ Статистика захворюваності (18–24.11.2022)\*



## ■ Кількість померлих у вікових групах (18–24.11.2022)



## ■ Показники вакцинації

**16 196 288** українців отримали хоча б одну дозу вакцини з початку вакцинальної кампанії

**2 862 499** осіб в Україні отримали першу бустерну дозу

**153 618** осіб в Україні отримали другу бустерну дозу

**34 763** особи отримали додаткову дозу вакцини

\* Звітний тиждень – п'ятниця-четвер.

Джерело: ЦГЗ МОЗ України

У цьому випуску дайджесту пропонуємо зручну тематичну навігацію по основних інформаційних блоках, що були розміщені в наших попередніх випусках.

Це важливо для кожного лікаря, хто має потребу оновити для себе чи для пацієнта певну тему.

## ■ «Гарячі» запитання

### ❓ Застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19:

- Чому потрібно вводити бустер після первинної вакцинації? [Випуск 2](#)
- Чи можна для бустерних доз використовувати вакцини від інших виробників/на інших платформах? [Випуск 1](#)
- Чи можна для бустерних доз використовувати вакцину проти COVID-19 на іншій платформі? [Випуск 2](#)
- Отримана в пункти щеплення вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.1 призначена лише для використання як бустерна доза? [Випуск 3](#)
- Чим відрізняється додаткова доза вакцини від бустерної дози? [Випуск 4](#)
- Які інтервали прийняті в Україні для введення додаткової, бустерної доз вакцин проти COVID-19? Чи є залежність від віку? [Випуск 4](#)
- Коли вводиться перша бустерна доза вакцини проти COVID-19, якщо була введена додаткова доза вакцини? [Випуск 5](#)
- Чи вакцина проти COVID-19, яка адаптована під варіант «Омікрон», може бути використана для первинної вакцинації? [Випуск 6](#)

9. Як діяти в ситуації, якщо вакцину проти COVID-19, адаптовану під варіант «Омікрон» (Comirnaty Original / Omicron), було введено як дозу в первинній вакцинації? [Випуск 6](#)

10. Для чого потрібно вводити бустер після первинної вакцинації? [Випуск 9](#)

### ❓ Вакцинація проти COVID-19 осіб із онкопатологією, імуносупресованих осіб:

- Коли можна вакцинувати людину проти COVID-19, якщо вона має онкологічне захворювання? [Випуск 9](#)
- Чи можна вакцинувати проти COVID-19 онкохворих? Чи проведення хіміотерапії є протипоказанням до вакцинації? [Випуск 9](#)
- Чи безпечно застосувати наявні в Україні вакцини проти COVID-19 у пацієнтів, які отримують імуносупресивну/імуномодулюючу терапію з приводу аутоімунних ревматичних захворювань? [Випуск 5](#)

### ❓ Вакцинація осіб, що живуть із ВІЛ

- Чи безпечні вакцини проти COVID-19 для людей, які живуть із ВІЛ? [Випуск 2](#)

## Вакцинація проти COVID-19 осіб із туберкульозом

1. Чи можна вакцинувати проти COVID-19 людину, яка приймає протитуберкульозні препарати, є МБТ+? [Випуск 2](#)
2. Як поєднати вакцинацію проти COVID-19 із проведенням проби Манту/IGRA? [Випуск 2](#)

## Вакцинація проти COVID-19 вагітних та під час лактації:

1. Чи можна вакцинувати вагітних проти COVID-19 і в якому триместрі вагітності? [Випуск 3](#)

## Вакцинація проти COVID-19 при порушеній схемі щеплення

1. Якщо порушені інтервали введення доз вакцин проти COVID-19 – наприклад, не введена через 6 міс. бустерна доза, то чи потрібно починати все спочатку? [Випуск 1](#)
2. Чи враховувати дозу вакцини проти COVID-19, яку було введено раніше ніж зазначений в інструкції інтервал? І чи потрібно повторювати введення такої дози? [Випуск 1](#)

## Посадження вакцин проти COVID-19 з вакцинами проти інших інфекційних хвороб

1. Чи можна поєднувати вакцини проти COVID-19 з вакцинами проти грипу? [Випуск 1](#)

## Вакцинація проти COVID-19 дітей

1. Чи можна вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 5–11 років вакциною, що використовується для дітей віком понад 12 років, але в меншому об'ємі? Наприклад, набрати в шприц не 0,3 мл, а 0,1 мл. [Випуск 5](#)
2. Чи має особливості введення першої бустерної дози у дітей порівняно з дорослими? [Випуск 7](#)
3. Чи схвалена в Україні вакцинація проти COVID-19 дітей віком 5–11 років? Якщо так, які особливості? [Випуск 7](#)
4. Якщо дитині на момент отримання другої дози вакцини в первинній серії чи отримання бустерної дози виповнилося 12 років, а до цього віку вона вже встигла отримати одну чи дві дози, то яку вакцину слід обрати і як правильно продовжити вакцинацію проти COVID-19? [Випуск 7](#)

## Протипоказання та підготовка до вакцинації проти COVID-19

1. Чи варто перед вакцинацією та після неї визначати антитіла до COVID-19? [Випуск 1](#)
2. Чи потрібно рекомендувати проведення тесту на антитіла до SARS-CoV-2 після або перед вакцинацією/ревакцинацією (бустером) проти COVID-19? [Випуск 6](#)

## Світова практика

### США

- Дозвіл на використання бівалентних вакцин [Випуск 1](#)
- Схвалена вакцинація дітей віком від 6 міс. [Випуск 2](#)
- Ревакцинація дітей та підлітків [Випуск 2](#)
- Охоплення вакцинацією дітей віком 5-11 років [Випуск 3](#)
- Застосування бівалентної вакцини [Випуск 4](#)
- Оновлена інформація про вакцинацію проти COVID-19, безпека вакцин для дітей і вагітних [Випуск 5](#)
- Застосування бівалентної вакцини [Випуск 7](#)

### ЄС

- Дозвіл на використання бівалентних вакцин [Випуск 1](#)
- Схвалення до використання вакцин для дітей віком від 6 міс. [Випуск 6](#)

### Австралія

- Схвалена вакцинація дітей віком від 6 міс [Випуск 2](#)
- Первинна вакцинація та введення бустерних доз у дітей віком до 12 років [Випуск 7](#)
- Інтервал до введення дози вакцини після перенесеного COVID-19 [Випуск 7](#)

### Німеччина

- Вакцинація осіб, які перехворіли на COVID-19 [Випуск 4](#)

### Сполучене Королівство

- Застосування бустерних доз у дітей [Випуск 2](#)
- Застосування другого бустера у дорослих [Випуск 3](#)

### Нова Зеландія

- Застосування бустерних доз у дітей [Випуск 3](#)

### ВООЗ

- Заява ВООЗ про перебіг пандемії COVID-19 [Випуск 5](#)
- Заява ВООЗ щодо нових субваріантів ХВВ та BQ.1 [Випуск 6](#)
- Заява про перше глобальне збільшення тижневих випадків COVID-19 за чотири місяці [Випуск 9](#)

### Данія

- Застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19 восени 2022 року [Випуск 9](#)

### Ірландія

- Застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19 [Випуск 1](#)
- Одночасне введення вакцин проти COVID-19 з вакцинами проти інших інфекційних хвороб [Випуск 1](#)

### Швеція

- Рекомендації з вакцинації проти COVID-19 вагітних, дітей, дорослих, доросли віком понад 65 років та групи ризику [Випуск 9](#)

## ■ Інтерв'ю в рубриці «Компетентно»



• Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України  
**Ігор КУЗІН** [Випуск 4](#)

• Заступник міністра охорони здоров'я  
**Ірина МИКИЧАК**  
[Випуск 5](#)



• Генеральна директорка ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»  
**Людмила ЧЕРНЕНКО** [Випуск 6](#)

• Міністр охорони здоров'я України  
**Віктор ЛЯШКО** [Випуск 7](#)



## ■ Накази МОЗ та Позиції НТГЕІ

- Пріоритетність в отриманні другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 [Випуск 1](#)
- Універсальна доступність другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 [Випуск 1](#)
- Одночасне введення вакцин проти COVID-19 та вакцин проти інших інфекційних хвороб [Випуск 2](#)
- Застосування бустерних доз вакцини проти COVID-19 у дітей віком понад 12 років [Випуск 3](#)
- Вакцинація вагітних проти COVID-19 [Випуск 3](#)
- Вакцинація осіб зі злоякісними новоутвореннями [Випуск 4](#)
- Вакцинація проти COVID-19 осіб, які отримують імуносупресивну /імунomodуючу терапію з приводу аутоімунних ревматичних захворювань [Випуск 5](#)
- Вакцинація проти COVID-19 осіб, які перехворіли на COVID-19 [Випуск 6](#)
- Тактики вакцинації вагітних, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac до настання вагітності [Випуск 7](#)
- Надання доступу до вакцинації проти COVID-19 дітям 12–17 років незалежно від наявності щеплень, які відповідають Календарю профілактичних щеплень [Випуск 7](#)
- Вакцинація проти COVID-19 осіб, які мали / мають тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19 або з підозрілим чи ймовірним випадком COVID-19 (за винятком контакту через виконання професійних обов'язків) та не мають симптомів гострої респіраторної інфекції [Випуск 8](#)
- Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» [Випуск 8](#)
- Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 028-4/о «Журнал обліку висновків лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» [Випуск 8](#)

## ■ Nota bene

Рекомендуємо скористатись можливістю **отримати безоплатний доступ** для українських лікарів до платформи **UpToDate** – провідного глобального клінічного ресурсу доказової медицини.

Для цього слід зареєструватися за посиланням: [uptodate.phc.org.ua](https://uptodate.phc.org.ua)

Детальніше про механізм реєстрації – на сайті Центру громадського здоров'я: [phc.org.ua/uptodate](https://phc.org.ua/uptodate)

Радимо ознайомитись із додатковими корисними джерелами достовірної інформації про COVID-19 та вакцинацію.

1. Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні: [vaccination.covid19.gov.ua](https://vaccination.covid19.gov.ua)
2. Брошура для медиків «Як розмовляти з пацієнтами про COVID-19» – у каталозі діджитал- та друкованих матеріалів «Спільнотека» від ЮНІСЕФ [spilnoteka.org](https://spilnoteka.org)



Маєте запитання за темою COVID-19 та вакцинації чи пропозиції щодо наповнення дайджесту – переходьте за QR-кодом і пишть нам, будемо вдячні за зворотний зв'язок, що допоможе зробити ще кориснішу підбірку в наступних випусках.



**Усі випуски дайджесту – за посиланням через QR-код**